



PLEZIN[®]
50 WG

*Farklı Etki Mekanizması ile
Zararlılar Kontrol Altında!*



PLEZİN®

50 WG

Suda Disperse Olabilen Granül (WG)
İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Aktif Madde Adı ve Miktarı: % 50 Pymetrozine
Etki Şekli: Kontak

Grubu

9B

İnsektisit

ÖZELLİKLERİ:

PLEZİN 50 WG; karpuz, pamuk, domates, şeftali ve turunçgillerde Yaprak Biti, patlıcanda Beyaz Sinek mücadelesinde kullanılan ve faydalı bir çok haşereye karşı zarar vermeyen seçici bir insektisittir.

PLEZİN 50 WG, yeni bir etki mekanizmasına sahip olup Yaprak Bitleri ve Beyaz Sineği temas (kontak) ve sistemik olarak (bitki öz suyuna geçerek) kontrol eder. İlacın etkili maddesi "pymetrozine" zararlılar tarafından alındığında, beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölürlür.

PLEZİN 50 WG, Beyaz Sineklerin hem larvaları hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan Yaprak Bitleri gibi bu zararlıların da virüs naklini önlemiş olur.

PLEZİN 50 WG, Yaprak Bitleri ve Beyaz Sinek zararlılarının hassas ve dayanıklı türlerine yüksek derecede etkilidir. Bu ilaç faydalı haşerelerin birçoğuna zarar vermez.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Patlıcan (Sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	60 g / 100 L su larva, ergin	3 gün
Karpuz	Yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	25 g / da nimf, ergin	7 gün
Pamuk	Yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	30 g / da nimf, ergin	35 gün
Domates (Tarla)	Yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	30 g / da nimf, ergin	3 gün
Şeftali	Yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 g / 100 l su nimf, ergin	21 gün

UYGULAMA TEKNİĞİ:

* **İlaçlama aleti ve ilaçlama hacmi:** Traktör pülverizatörler, motorlu atomizörlerle kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan sebzelerde iyi bir kaplama için özen gösterilmelidir.

* **Kullanımla ilgili Tavsiyeler:** İlaçlamalara yaprak başına; patlıcanda 4-5 beyazsinek larvası, karpuz ve domateste en az 2 nimf veya ergini görüldüğünde başlanır. Pamukta en az 25 yaprak biti nimf veya ergini görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Şeftalide ise 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Yeşil aksam ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalı, ancak ilaçlı mahlülün bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. Tavsiye dozu aşılmamalı, ilaçlı mahlülün hedef dışındaki bitkilere sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İş bittikten sonra tüm ekipman iyice yıkanmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği kültür bitkisinde kullanıldığında iyi tolere edilir. Şüpheli halinde (hassas veya yeni çeşitlerde) önce bitki toleransı kontrol edilmelidir.

ENTEĞRE MÜCADELE VE ANTİ-RESİSTANS STRATEJİ:

Sezon başında tespit edilen bir ilaçlama planına göre uygulanır. Mahalli ekonomik zararlı eşiklerine dikkat edilmelidir. Değişik etki mekanizmalı ilaçlarla değişim halinde kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

PLEZİN 50 WG, nötr reaksiyonlu birçok insektisit ve fungisit ile karışım halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde çiftçiye ön karışım yapılması tavsiye edilir. **PLEZİN 50 WG** faydalı haşerelere yaşam şansı verdiğinden, bunlar da zararlıların kontrolüne katkıda bulunur.



Beyaz Sinek
(*Bemisia tabaci*)



Yaprak Biti
(*Aphis gossypii*)



Yaprak Biti
(*Aphis gossypii*)



Yaprak Biti
(*Myzus persicae*)



Ambalaj Şekli:
250 g*24 adet



Daha iyi bir tarım için, ideal ortağınız.
Your ideal partner for better agriculture

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk.
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60 pbx
Fax : (0332) 239 14 66
Web : www.safatarim.com

YouTube /SAFATARIM

facebook /SAFA.TARIM.AS

@SAFA_TARIM