

Comprador

SC 350

Litrede 350 gram imidacloprid

*Zararlılarla Mücadelede
Sorunuza Yeni Bir Çözüm*



Ürününüzün Değerini Artırır.

Comprador SC 350

Litrede 350 gram imidacloprid

Ürününüzün Değerini Artırır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR			
Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yaprak Biti (<i>Aphis gossypii</i>)	35 ml./da Nimf, Ergin	14 Gün
	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	85 ml./da Nimf, Ergin	
	Yaprak Piresi (<i>Empoasca decipiens</i>)	35 ml./da Nimf, Ergin	
Armut	Armut Yaprak Pireleri (<i>Cacopsylla spp.</i>)	40 ml./100 L su Nimf, Ergin	14 Gün
Şeftali	Yaprak Biti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml./100 L su Nimf, Ergin	14 Gün
Elma	Yaprak Biti (<i>Aphis pomi</i>)	20 ml./100 L su Nimf, Ergin	14 Gün
Domates	Yaprak Biti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml./100 L su Nimf, Ergin	7 Gün
	Tel Kurtları (<i>Agriotes spp.</i>)	100 ml./da, Nimf, Ergin damlama sulama ile	
Narenciye	Turuncgil Yaprak Galeri Güvesi (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	3.5 ml./ ağaç gövde çapı 3 cm'ye kadar olan fidanlarda	14 Gün
		6 ml./ ağaç gövde çapı 5 - 6 cm'ye kadar olan fidanlarda, Larva	
Antep Fıstığı	Yaprak Psillidi (<i>Agonoscena targionii</i>)	30 ml./100 L. su Nimf, Ergin	14 Gün
Patates	Patates Böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	15 ml./da Ergin, Larva	14 Gün
Patlıcan	Yaprak Biti (<i>Aphis fabae</i>)	20 ml./100 L su Nimf, Ergin	7 Gün
	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml./da Nimf, Ergin damlama sulama ile	
Fasulye	Yaprak Biti (<i>Aphis fabae</i>)	20 ml./100 L su Nimf, Ergin	7 Gün
Bamya	Yaprak Biti (<i>Aphis fabae</i>)	20 ml./100 L su Nimf, Ergin	7 Gün



Yaprak Biti (*Aphis gossypii*)



Yaprak Biti (*Aphis pomi*)



Beyaz Sinek (*Bemisia tabaci*)



Tel Kurtları (*Agriotes spp.*)



Yaprak Piresi (*Empoasca decipiens*)



Turuncgil Yaprak Galeri Güvesi (*Phyllocnistis citrella*)



Armut Yaprak Pireleri (*Cacopsylla spp.*)



Patates Böceği (*Leptinotarsa decemlineata*)



Yaprak Biti (*Myzus persicae*)



Yaprak Biti (*Aphis fabae*)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli miktar ilaç, yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KÖK BOĞAZI İLAÇLAMASI

Domateste Tel Kurtlarına Karşı; dekadaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150ml mahul hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı belirlenir. 100ml ilaç bir kaba konur ve üzerine belirlenen su miktarı konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150ml gelecek şekilde verilir.

Narenciye Yaprak Galeri Güvesine Karşı; ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kökboğazının çevresine küçük bir yarak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 litre su ile karıştırılarak yavaşıca fidanların kökboğazına dökülür. İlaçlamadan 1-2 gün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır.

DAMLA SULAMA İLAÇLAMASI

Önce damlama sulama sistemi 5-6 dakika çalıştırılarak bitkilerin kök bölgeleri ıslatılır. Gerekli miktardaki ilaç (100ml./da) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaşı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır.

Budama yapılmış patlıcanda ilaçlama öncesi damla sulama ile etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç içinde sisteme verilir. (100ml./da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar daha devam edilir.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Yüksek derecede alkali özellikteki ilaçlarla karıştırılmaz.

SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O. S. B.

İhsandede Cd. 20. Sk

No: 35 - KONYA

Tel : (0332) 239 14 60(pbx)

Fax : (0332) 239 14 66

Web : www.safatarim.com

