

Artiste® 240 SC

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 gram Thiamethoxam
Süspansiyon Konsantre (SC)



Mücadelenin Yıldızı

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ

ARTİSTE 240 SC ilacının etkili maddesi "Thiamethoxam" zararlılara hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup, böceklerin sinir sistemi üzerinde tesirlidir. Bitki aksamı tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR			
Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arası Süre
Pamuk	Pamuk Yaprak Biti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 ml/da, nimf-ergin	28 gün
Patlıcan (Tarla)	Beyazsinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 ml/da, ergin-larva	5 gün
Domates (Tarla)	Yaprak Biti (<i>Myzus persicae</i>)	15 ml/da, nimf-ergin	5 gün
Domates (Sera)	Beyazsinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da, ergin-larva Damla sulama	5 gün
Biber (Sera)	Beyazsinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da, ergin-larva Damla sulama	5 gün
Şeftali	Şeftali Yaprak Biti (<i>Myzus persicae</i>)	10 ml/100 L su, ergin	14 gün
Armut	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	25 ml/100 L su, nimf	14 gün
Marul	Yaprak Biti (<i>Aphis gossypii</i>)	20 ml/da	7 gün
Elma	Yeşil Yaprak Biti (<i>Aphis pomi</i>)	15 ml/100 L su, nimf-ergin	14 gün



Pamuk Yaprak Biti (*Aphis gossypii*)



Beyazsinek (*Bemisia tabaci*)



Yaprak Biti (*Myzus persicae*)



Armut Psillidi (*Cacopsylla pyri*)



Yeşil Yaprak Biti (*Aphis pomi*)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız. İlaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlul her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerekli olduğunda daha fazla ilaçlı mahlul hazırlanmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Pamuk: Fide devresinde % 50 bulaşık fide, tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 adet yaprak biti görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Şeftali: 100 adet sürgünün 7'si bulaşık olduğunda ve erginlerin 3/4'ünün kanatlı forma dönüştüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.

Domates (sera) ve Biber (sera): İlaç damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10' u geçmemelidir.

Armut: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve zararlı nimflerinin salgıladığı tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde, sürgünlerin %15' den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğünde o sürgün bulaşık kabul edilir.

Marul: 20-40 adet yaprakta bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet olduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır.

Elma: Sürgünlerin % 15'inin bulaşık olması halinde ilaçlamaya başlanmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KARIŞILIRLIK DURUMU: **ARTİSTE 240 SC**, depo karışımı olarak kullanılacaksa, **ARTİSTE 240 SC**' den önce "Suda erir ambalajlı" (WSB) ilaçlar aletin deposuna konur. Ambalajlar tamamen erir, ilaçlar çözülür. Sonra **ARTİSTE 240 SC** tanka ilave edilir. **ARTİSTE 240 SC** yaygın olarak kullanılan birçok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışılabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

Ruhsat Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.