

Adından söz ettirir...



PLATFORM® 10 EC



100 g / L. Pyriproxyfen

SAFA TARIM®

ÖZELLİKLERİ

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürlər.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Şeftali	Dut Kabuklu Biti (<i>Pseudaulacaspis pentagone</i>)	50 ml/ 100 L su (larva)	14 gün
Patlıcan	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (larva)	3 gün
Biber (sera)	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/100 L su (larva)	3 gün
Pamuk	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (larva)	28 gün
Domates (sera)	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/100 L su (larva)	1 gün
Hiyar (sera)	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/100 L su (larva-pupa)	1 gün
Turunçgil	Kırmızı Kabuklu Bit (<i>Aonidiella aurantii</i>)	50 ml/100 L su (larva)	28 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. İlaçlamaya başlamadan önce, kullanma aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürtülerek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Her türlü aletle püskürtülebilir.

Şeftalide Dut Kabuklu Biti: İlaçlamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Domates ve Hiyarda Beyaz Sinek: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanın seraya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

Turunçgilde Kırmızı Kabuklu Bit: Kişi erginlerinin yavrulamaya başladığı ve çoğunuğun birinci dönemde olduğu devrede ilaçlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özellikler dışında yaygın fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA SAFA TARIM A.Ş.



Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.



Dut Kabuklu Biti
(*Pseudaulacaspis pentagone*)



Beyaz Sinek
(*Bemisia tabaci*)



Kırmızı Kabuklu Bit
(*Aonidiella aurantii*)