

Pyrazon[®] Süper

Süspansiyon Konsantre (SC)
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)



Şeker Pancarında

**YABANCI OTLAR
KONTROL
ALTINDA**

Pyrazon Süper®

Süspansiyon Konsantre (SC)

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 500 g/L Chloridazont

Grubu	C1	Herbisit
-------	----	----------

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
ŞEKERPANCARI	Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	Serçe dili (<i>Stelleria media</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ:

Pyrazon Süper, yabancı otların kök ve yaprakları yoluyla alınarak etkili olur. Yabancı otlar toprak yüzeyine çıkmadan önce toprağa uygulanırsa henüz çimlenmekte olan otların kökleri tarafından alınır ve onları toprak içerisindeyken veya toprak yüzeyine çıkarken öldürür. Esas etki topraktan olduğu için, mücadelede iyi bir başarı ancak toprakta etkili maddenin çözünüp yayılmasına yetecek rutubetin bulunmasıyla elde edilir. Keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı iyi bir etki için şarttır. Ahır gübresi kullanılacaksa bu gübreleme ilkbaharda değil sonbaharda yapılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Pancar ekiminden önce:

İlkbaharı kurak geçen bölgelerde ve geç ekimlerde tavsiye edilir. **Pyrazon Süper** ekime hazır hale getirilmiş tarlaya uygulanır ve kürümler veya tırmıkla yüzeyel olarak (3-4 cm) toprağa karıştırılır. **Pyrazon Süper**, en emin ve yaygın şekilde bu zamanda kullanılır. Böylece toprak rutubetinden de istifade eder ve daha az bir yağışla etkili olur.

Ekiminden sonra, pancar çıkışından önce:

Pyrazon Süper, ekimden hemen sonra başlayıp pancarın çıkışından birkaç gün öncesine kadar olan devrede yüzey ilaçlaması şeklinde de kullanılabilir. Bu kullanım şekli ilkbahar yağışları bol ve düzenli olan bölgelerde tavsiye edilir. **Pyrazon Süper**'in etkili olabilmesi için ilaçlamadan sonraki 2-3 hafta içerisinde yaklaşık olarak 20-25 mm yağışa ihtiyaç vardır. Yağmur yağmazsa, yağmurlama şeklinde sulama yapılmalıdır. İyi bir etki için keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı gereklidir. Dekara 20-40 lt suyla uygulanmalıdır.

İlacın hazırlanışı:

Doza göre ölçülen ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak boşaltılır ve depo suyla tamamlanır.

Etki Süresi ve Münavebe:

Pyrazon Süper'in etkisi, iklim ve toprak şartlarına göre birkaç hafta ile birkaç aya kadar sürebilir. Herhangi bir sebepten dolayı pancarı bozmak gerektiğinde (sel, dolu vs.) aynı tarlaya tekrar patates, soğan ve mısır ekilebilir. **Pyrazon Süper** tavsiyeye uygun şekilde kullanılırsa pancarın normal hasadından sonra ekilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir fitotoksite yapmaz.


DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PYRAZON SÜPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PYRAZON SÜPER**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.

Ambalaj Şekli:
1 Litre x 20 adet
5 Litre x 4 adet



Horozibiği (*Amaranthus albus*)



Köpek üzümü (*Solanum nigrum*)



Serçe dili (*Stelleria media*)



Sirken (*Chenopodium album*)



Büyükkayacık Mah. 20 No'lu Sokak
No:31 Selçuklu / KONYA - TÜRKİYE

Tel : (0332) 239 14 60

Fax : (0332) 239 14 66

www.safatarim.com