

Cosinus[®]

OD 240

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantri (OD)
İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

Hızlı ve Sistemik Etki

* Cosinus OD 240, Thiacloprid etkili maddesini içeren OD formülasyonda olan bir insektisittir.

Bu sayede ilacın yaprakta tutumu ve yayılması artar.

* Yağmurla yıkanmaya karşı dirençlidir.

* Cosinus OD 240, sistemik etkisinin yanında translaminor etkiye sahiptir.

* Bitkinin bütün gelişme döneminde rahatlıkla kullanılabilir.

* Faydalı böceklerle zararsızdır.

V.19.11.16



Cosinus[®]

OD 240

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)
İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

Grubu	4A	İnsektisit
-------	----	------------

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	40 ml/100 l su nimf ve ergin	14 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	40 ml/100 l su larva	
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 l su nimf ve ergin	14 gün
Kiraz	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	40 ml/100 l su ergin	14 gün
	Elma yaprak bükeni (<i>Archips rosanus</i>)	50 ml/100 l su larva	
Antepfıstığı	Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	50 ml/100 l su nimf ve ergin	21 gün
	Fidan dipkurdu (<i>Capnodis cariosa</i>)	50 ml/100 l su ergin	
Nar	Nar yaprakbiti (<i>Aphis punicae</i>)	40 ml/100 l su	7 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kaptta su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KULLANIM ŞEKLİ:

Kiraz sineğine karşı; görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde ilaçlamanın yapılması gereklidir.

Elma iç kurduna karşı; birinci dölün ilk ilaçlaması yumurtaları açılmaya başlayınca yapılmıştır. Birinci döle karşı ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama ve ikinci döle karşı bir ilaçlama yapılır. Buna göre birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1 olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.



Elma yeşil yaprakbitine karşı; sürgünlerin % 15'i bulaşıkça ilaçlama yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı; sürgünlerin % 15' i bulaşıkça, 2. ve 3. nimfin çoğunlukta olduğu dönemde ilaçlama yapılmalıdır.

Elma yaprak bükenine karşı; çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı % 5 ise çiçek taç yapraklarının %4'ü döküldüğünde bir ilaçlama yapılır. Gerekirse birinci ilaçlamadan 15 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılır.

Antepfıstığında yaprak psillidine karşı; bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığında fidan dipkurduna karşı; ergin popülasyonunun arttığı, sap dibinden yenmiş taze yaprakların görüldüğü, aşırı gözlerinin ya da sürgünlerin kemirildiği dönemde ilaçlamaya geçilmelidir.

Nar yaprakbitine karşı; ağaç başına 10 adet bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:


EC, SL, SC, WP ve WG formülasyonlu birçok konvansiyonel bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak emin olmak için bir karışım testi yapılmalıdır.



Elma yeşil yaprakbiti (*Aphis pomi*)



Elma içkurdu (*Cydia pomonella*)




Armut psillidi (*Cacopsylla pyri*)



Kiraz sineği (*Rhagoletis cerasi*)



Elma yaprak bükeni (*Archips rosanus*)



Nar yaprakbiti (*Aphis punicae*)



Büyükkayacık Mah. 20 No'lu Sokak
No:31 Selçuklu / KONYA - TÜRKİYE

Tel : (0332) 239 14 60

Fax : (0332) 239 14 66

www.safatarim.com

Ambalaj Şekli:
200 ml x 40 adet
400 ml x 20 adet
1 Litre x 20 adet