

ÖZELLİKLERİ:

RUTGERS 22E organik fosforlu bir bileşim olup kavun, karpuz, bağ ve depolanan bitkilerde zarar yapan çeşitli haşere'lere karşı tavsiye edilen geniş spektrumlu bir ilaçtır. **RUTGERS 22E** haşere'lere mide, temas ve buharlaşma yolu ile etki eder. İlaçlamadan sonra bitkilerde bakiye bırakmaması, çok düşük zehirliliği ilacın önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle **RUTGERS 22E** bağlarda ve diğer yenilen bitkilerde gayet emniyetli olarak kullanılır. Emülsiyon konsantré bir ilaç olan **RUTGERS 22E** suyla kolayca karıştığından, her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. En iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Sebze	Thripsler (<i>Thrips spp.</i>) Yaprak Pireleri (<i>Empoasca spp.</i>) Yaprak Bitleri (<i>Aphis spp.</i>)	375 ml/da	7 gün
Bağ	Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	200 ml/100 L su	7 gün
Lahana	Lahana Kelebeği (<i>Pierris brassicae</i>)	150 ml/100 L su	7 gün
Boş Ambar İlaçlaması	Buğday Biti (<i>Sitophilus granarius</i>) Kırma Biti (<i>Tribolium confusum</i>) Ekin Kambur Biti (<i>Rhizopertha dominica</i>)	425 ml/100 m ²	7 gün
Kuru Meyve Zararlari	Kuru incir kurdu (<i>Ephestia cautella</i>) Kuru Meyve Güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>) Tütün Güvesi (<i>Ephestia elutella</i>) Kuru Üzüm Güvesi (<i>Ephestia figuliella</i>) İç Fındık Güvesi (<i>Paralipsa gularis</i>) Ekşilik Böcekleri (<i>Carpophilus spp.</i>) Testereli Böcek (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>) Kuru Meyve Akarı (<i>Carpoglypus lactis</i>)	425 ml/100 m ²	7 gün

İLACIN HAZIRLANMASI:


İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki **RUTGERS 22E**'yi bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içine yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:


RUTGERS 22E kuvvetli alkali karakterdeki hariç, bilinen birçok insektisit, fungisit ve akarisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. **RUTGERS 22E** ile yapılacak karışımıları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir.



Thripsler (*Thrips spp.*)



Yaprak Pireleri (*Empoasca spp.*)



Salkım Güvesi (*Lobesia botrana*)



Testereli Böcek
(*Oryzaephilus surinamensis*)

RUGERS® 22 E

Litrede 227 gram Chlorpyrifos - methyl



**Thrips Problemine
Ekonomik ve Etkili Çözüm**