



Audit[®] Ultra

✓ Pas Mücadelesi

✓ Külleme Mücadelesi

✓ Septorya Yaprak Lekesi Mücadelesi



✓ Cercospora Yaprak Lekesi
Hastalığı Mücadelesi

SAFA TARIM[®]

Audit[®] Ultra

SC (Süspansiyon Konsantre)
FUNGİSİT (Mantar İlacı)
Aktif Madde: 310 g/L Thiophanate-Methyl + 187g/L Epoxiconazole
Etki Şekli: Sistemik - Sistemik

Grubu	B1,1	G1,3	Fungisit
-------	------	------	----------

ETKİ ŞEKLİ ve ÖZELLİKLERİ:

Sistemik özellikte, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungisittir. İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere taşınarak daha sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel koruma sağlar.

Epoxiconazole: Ergosterol biosentezini engellemek suretiyle fungusun ölümüne neden olur.

Thiophanate-methyl: Fungusun çoğalması için gerekli olan DNA sentezi ve mitoz bölünmede önemli rol üstlenen Tubulin biosentezini engeller. Yapraklardan ve köklerden alınabilir.

Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir.

Güçlü sistemik etkiye sahip iki etkili maddenin mükemmel kombinasyonudur. Bu şekilde etki mekanizmaları farklı iki maddenin bir araya gelmesi, mantarların bağışıklık kazanma riskini de ortadan kaldırır.

Sistemik olarak hızla bitki bünyesine girerek daha önce oluşmuş olan hastalık yapılarını bertaraf eder.

Ortamdaki hastalık enfeksiyonunu hemen durdurur.

Hastalıkları mükemmel bir şekilde kontrol ederken, aynı zamanda bitkide enzim faaliyetini artırmak suretiyle bitki biyokimyasının güçlenmesini sağlar. Uzun süren kalıcı etkisi ile mükemmel korumanın yanında hastalıkla savaşımında ilaçlama sayısını azaltır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Şeker Pancarı	Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	50 ml/ da	28 gün
Buğday	Pas (<i>Puccinia spp.</i>) Külleme (<i>Erysiphe graminis f. sp tritici</i>) Septorya Yaprak Lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	60 ml/ da	35 gün

KULLANMA ZAMANI ve ŞEKLİ:

Şeker pancarının yaşlı yapraklarında % 5 lekelenme sınırına ulaşıldığında ilaçlamaya başlanmalıdır ve 15-20 gün arayla tekrarlanmalıdır. Buğday-pas hastalıklarında ilk belirtiler görülmeye başladığında ilk ilaçlama, ilk ilaçlamadan 21-28 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Epidemiy ihtimali varsa 3. ilaçlama yapılabilir. Buğday küllemesi ve septorya yaprak lekeli hastalıklarında ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

ALPAC ile karıştırılarak uygulanabilir. Karışımlar bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir.



Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığı
(*Cercospora beticola*)



Pas (*Puccinia spp.*)



Külleme
(*Erysiphe graminis f. sp tritici*)



Ambalaj Şekli:
1 L * 20 adet

Ruhsat Sahibi ve Üretici Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık MAhallesi 20 Nolu Sokak No: 31
Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.