

Hazır Sıvı Bordo Bulamacı

**BORDOPOWER®**  
**SC**

Yarı Doz,  
Üstün Kaplama  
Kabiliyeti



SAFA TARIM®

## KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

| Bitki Adı | Hastalık Adı                                              | Kullanma Dozu                                                                                   | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bağ*      | Bağ Mildiyösü ( <i>Plasmopara viticola</i> )              | 1. ilaçlama 400 ml / 100 L su<br>2. ilaçlama 500 ml / 100 L su<br>3. ilaçlama 600 ml / 100 L su | 21 gün                            |
| Elma      | Karaleke Hastalığı ( <i>Venturia inaequalis</i> )         | 1000 ml/ 100 L su                                                                               | 14 gün                            |
| Şeftali   | Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı ( <i>Taphrina deformans</i> ) | 1000 ml/ 100 L su                                                                               | 14 gün                            |

Bağ Mildiyösü (*Plasmopara viticola*)Karaleke Hastalığı (*Venturia inaequalis*)Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı (*Taphrina deformans*)

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

## İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kaptan az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama esnasında bitkiler iyi bir şekilde yıkanmalı yaprakların alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havada yapılmalıdır.

## İLACIN KULLANIM ŞEKLİ

## Bağda Mildiyöye Karşı:

Bağda sürgünler 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre ilaçlamalar 12 gün ara ile yapılır.

## Elmada Karalekeye Karşı:

- 1.ilaçlama:** Çiçek gözleri kabardığında,
- 2.ilaçlama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde; Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde,
- 3.ilaçlama:** Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğü dönemde,
- 4.ve diğer ilaçlamalar:** Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 14 gün ara ile yapılır.

## Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı Hastalığına Karşı:

Tomurcuklar kabarmaya başlayınca bir ilaçlama yapılır. Tomurcukların iyice ilaçlanmasına özen gösterilir.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlar ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.



Ambalaj Tipi: 1 Litre, 10 Litre  
Kolideki Adedi: 1L \* 20 adet, 10L \* 2 adet

## RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.



Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.  
20. Sk. No: 35 KONYA  
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66  
Web: www.safatarim.com  
E-mail: info@safatarim.com



**UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)**  
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

**Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.**