

Clipper®

200 EC

Çeltikte Yabancı Ot Mücadelesinde Mükemmel Performans, Güçlü Etki...

Clipper® 200 EC



Darıcan-Çinek (*Echinochloa crus-galli*)



Su Ayırığı-Aygır Otu (*Paspalum paspalodes*)



Clipper® 200 EC 1 litrelik Ambalajlarda Yayıcı - Yapıştırıcı ile birlikte satılmaktadır.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114
Zehirlenme durumlarında arayınız.



Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.



SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mah. 3. O. S. B. İhsandede Cad. 20. Sk. No : 35 - Selçuklu / KONYA
Tel : 0.332. 239 14 60 - Fax : 0.332. 239 14 66
E-mail : info@safatarim.com Web : www.safatarim.com



KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma dozu
ÇELTİK	Darıcan-Çinek (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Su Ayırığı-Aygır Otu (<i>Paspalum paspalodes</i>)	Clipper® 200 EC + Yayıcı - Yapıştırıcı 75 + 75 ml/da

KULLANMA ŞEKLİ

Clipper® 200 EC, Çeltikte Darıcan (Çinek) ve Su ayırığına (Aygır otu) karşı aynı pakette (Twin pack) verilen **Yayıcı - Yapıştırıcı** ile karıştırılarak çıkış sonrası suya veya kuruya kullanılır.

1. SUYA ATIM

Çeltiğin 2-3 yapraklı. Darıcan'ın 2-4 yapraklı devresinde, ekimden itibaren takriben 15-20 gün sonra, tesviyesi iyi yapılmış tavalarda (barlarda) su seviyesi 10 cm iken **pülverizatörle** kullanılır. İlaçın pülverizatörle tatbikatı sırasında çeltiğin ve yabancı otların tamamen su seviyesinin altında olması ilaçtan en iyi sonucun alınmasını sağlar. **Clipper® 200 EC + Yayıcı - Yapıştırıcı**, 75 + 75 ml/da dozunda birbiriyle karıştırılarak pülverizatör ile tavalara (barlara) düzgün bir şekilde tatbik edilir. Uygulamadan sonra suyun tavada tutulma süresi çok önemlidir ve en geç 7 gün sonra boşaltılmalıdır.

2. KURUYA ATIM:

Çeltiğin 3-4 yapraklı, Darıcan'ın 3-5 yapraklı devresinde, tesviyesi iyi yapılmış tavalardaki su boşaltıldıktan sonra **Clipper® 200 EC + Yayıcı - Yapıştırıcı**, 75 + 75 ml/da dozunda birbiriyle karıştırılarak pülverizatör ile tavalara (barlara) düzgün bir şekilde tatbik edilir. Uygulamadan en çok 48 saat sonra tavalarda su ile doldurulur.

DİKKAT!

• **Clipper® 200 EC**, ilaçlamalarda beraber kullanılmak üzere yeterli miktardaki bu Yayıcı-Yapıştırıcı ile beraber satılmaktadır. İlaçtan en yüksek etkiyi alabilmek için muhakkak **Yayıcı - Yapıştırıcı** karıştırılarak ve **pülverizatör ile püskürtülerek** kullanılmalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ve **Yayıcı - Yapıştırıcı** ayrı bir kaptaki bir miktar su ile iyice karıştırılır ve yarıya kadar su ile doldurulmuş aletin deposuna aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken boşaltılır. Sonra gerekli su miktarının kalan kısmı alet karıştırıcısı çalışırken depoya eklenir. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörü veya traktöre monteli pülverizatör ile atılır.