



KÖCTEL 2000 DF

%35 Metalik Bakıra Eşdeğer
%53,8 Bakır Hidroksit

Yeni Nesil Koruyucu Fungisit

SAFA TARIM

ÖZELLİKLERİ

KOCTEL 2000 DF bağ, zeytin ve domates başta olmak üzere, tarım ürünlerinde görülen mantari hastalıkların mücadelesinde başarı ile kullanılan, bakır hidroksit terkipli ve koruyucu etkili bakırlı fungusittir. Kuru akışkan (Dry Flowable) formda olup, içerdiği bakır partiküllerinin çok küçük (0,17 mikron) olması nedeni ile yüzey kaplama özelliği diğer bakırlı preparatlardan çok daha üstündür. Daha iyi yayılır ve daha uzun süre koruyucu etki sağlar. Hiç tozuma uğramadığı için güvenle kullanılır. Özel formülasyonu nedeniyle hava şartlarından etkilenmez, yağmurla yıkanmaz.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	175 g / 100 L su	14 gün
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria Solani</i>)	200 g / 100 L su	14 gün
Zeytin	Halkalı Leke Hastalığı (<i>Spilocaea oleagina</i>)	175 g / 100 L su	14 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama, günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ

Bağ: Mildiyö: Sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca ilaçlamalara başlanır. Hava şartları ve bitkinin durumuna göre 7-10 gün ara ile devam edilmelidir. Hastalığın enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalktığı anda ilaçlamaya son verilir.

Domates: Erken yaprak Yanıklığı: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamalara başlanır, Hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile tekrarlanmalıdır.

Zeytin: Halkalı Leke Hastalığı: Marmara Bölgesinde: 1. İlaçlama: Ekim ayının ilk yarısında, 2.İlaçlama: Nisan ayının ilk yarısında yapılmalıdır.

Ege Bölgesinde: 1. İlaçlama: Ağaçların sürgün vermeden önceki durgun dönemi (Şubat ayında) 2.İlaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı dönem. (Nisan ayında)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksitesi tespit edilmeden diğer formülasyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Fosetyl-Al terkipli ilaçlar ve düşük pH'lı ilaçlar ile karıştırılmamalıdır. Fitotoksite riskine karşı, ilaç karışımındaki pH'nın 6,5'un altına düşmemesine dikkat edilmemelidir. Karıştırmadan önce ilaçların etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgiler dikkate alınmalıdır.



Bağ Mildiyö
(*Plasmopara viticola*)



Erken Yaprak Yanıklığı
(*Alternaria solani*)



Halkalı Leke Hastalığı
(*Spilocaea oleagina*)