

DİNAMO® SC

193,04 g/l metalik bakıra eşdeğer basic copper sulfate



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>)	500 ml/100 lt su	21 gün
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	500 ml/100 lt su	21 gün



Mildiyö (*Plasmopora viticola*)



Erken Yaprak Yanıklığı (*Alternaria solani*)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ

Her türlü yer aleti ile tatbik edilir. Havadan tatbik edilmez. Çiçeklenme döneminde kullanılmaz. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

İLACIN KULLANMA ŞEKLİ

DİNAMO SC, kontakt etkili bir fungusittir. Bitkinin her tarafının iyice ıslatılmasına özen gösterilmeli, yaprağın alt ve üst tarafında ince bir film tabakası meydana getirilmelidir. Tatbikattan sonra ilacı tamamen yıkayacak kadar yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Bağ'da Mildiyö

Eğer bölgede Tahmin ve Uyarı Sistemi uygulanıyorsa buna göre ilaçlama yapılmalıdır. Tahmin ve Uyarı Sistemi uygulanmıyorsa mücadeleye hastalık görülmeden önce başlanmalıdır.

- ilaçlama sürgünler 25–30 cm. boyda iken ilaçlamaya başlanır.
- ve daha sonraki ilaçlamalara 10-14 gün aralarla devam edilir.

Domates'te Erken Yaprak Yanıklığı

İlk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

DİNAMO SC, nötr reaksiyonlu olan her türlü zirai ilaç ile karışabilmektedir. **DİNAMO SC** önce az su ile karıştırılmalı, bu karışım toplam su miktarının yarısı kadar su ile karıştırılmalıdır. Bu karışıma su ile karıştırılmış diğer zirai ilaç karıştırılmalı ve bu iki karışıma yeterli miktarda su ilavesi ile karışım tatbikat dozuna iblağ edilmelidir.



Ambalaj Tipi - Kolideki Adedi
5 L * 4 adet

