

SAFFLAÖÜD

Litrede 400 g Buprofezin

DOĞRU İLAÇ KAZANDIRIR



KABUKLU BİT VE BEYAZ SİNEK İLACI

SAFFLAUD

KABUKLU BİT VE BEYAZ SİNEK İLACI

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Son Kullanma ile Hasat Arasındaki Süre
Turunçgiller	Sarı Kabuklu Bit (<i>Aonidiella citrina</i>)	65 ml / 100 L. su, nimf dönemi	60 gün
	Kırmızı Kabuklu Bit (<i>Aonidiella aurantii</i>)	65 ml / 100 L. su, nimf dönemi	
	Turunçgil Beyaz Sineği (<i>Dialeurodes citri</i>)	35 ml / 100 L. su	



Sarı Kabuklu Bit
(*Aonidiella citrina*)
(Yaprak ve Meyvede Zarar Yapar)



Kırmızı Kabuklu Bit
(*Aonidiella aurantii*)



Turunçgil Beyaz Sineği
(*Dialeurodes citri*)

KULLANMA ŞEKLİ

Kabuklu Bit Mücadelesi: Turunçgillerde yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı *Aonidiella citrina* için 20'den fazla; veya 100 yaprağa düşen *Aonidiella aurantii* 50'den fazla ise bu bahçelerde ilaçlama gereklidir. İlaçlama gereken bahçelerde bu zararlılara karşı kışın (hasattan hemen sonra başlanıp Şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yazın ilk hareketli nimf görüldükleri iki hafta sonra olmak üzere iki ayrı zamanda ilaçlama yapılabilir. Popülasyonun durumuna göre ilaçlamalara kontrol olarak devam edilir. İlaçlamalardan en iyi sonucu alabilmek için ilaçlamalara ağaçların iç taraflarından başlanmalı, daha sonra ağacın tacının çevresi dolaşarak ağaç alttan üstten her tarafı iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgil Beyaz Sineği Mücadelesi: Yapılan kontrollerde yaprak başına en az üç adet canlı birey (yumurta, nimf) görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır. Doğada ilk kez 3. Dönem nimfler görüldüğünde 1. ilaçlama yapılır. Bu dönem Haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. 2. ilaçlama ikinci döl karşı Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren yapılır. İlaçlamada özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt yüzeylerinin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir. İlaçlama için bir depoya gerekli ilaç miktarı önce ayrı bir kaptaki sulandırılır ve aletin yarıya kadar doldurulmuş deposuna ilave edilir ve karıştırılır. Sonra depo tamamen doldurulur.

•Kabuklu Bitler

Narenciye'de beslendiği bitki dokusunu sokarak salgıladığı zehirli maddelerle hücre dokusunun parçalanmasına neden olur ve hücre suyunu emerler, dolayısıyla dokular hızla ölür, hücrelerde klorofil oluşumunu ve stomaları kapadığı için de özümlemeyi engeller. Sonuçta yaprakların dökülmesi, ağaçlarda durgunluk, meyve azalması, meyvelerde kirlenmeye neden olup pazar değerinin düşmesi kaçınılmaz olur.

•Beyaz Sinek

Narenciye'de bitkinin öz suyunu emerek zararlı olurlar, özellikle nimflerin çıkardıkları katkimsı maddeler (Fumajin) yaprakları ve meyveleri tamamen kaplar; ağaçların verimi, meyvelerin kalitesi ve ticari değeri çok düşük olur.

•Safflaoud bir IGR (Böcek büyüme düzenleyicisi) olup, nimf ve larvaların gömlek değiştirmelerini engelleyerek öldürür. Temas ve mide yoluyla etkilidir.

•Safflaoud IPM (Integrated Pest Management) programına uygun olup faydalı böceklerle seçicidir.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Safflaoud, Lambda cyhalothrin, chlorfluazuron, hexaconazole, fenproxymate, pirimiphos-methyl, primicarb etkili maddeli ilaçlar ile karıştırılarak kullanılabilir. Karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacak ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.

ÖNEMLİ NOT

Kullanmadan önce ilacın etiketini dikkatlice okuyunuz ve tavsiyelere uyunuz. Esas olan ilacın etiketindeki bilgilerdir. Zehirlenme Durumlarında (UZEM) Ulusal Zehir Merkezi'nin 114 Numaralı Telefonuna Danışılmalıdır.



Kayacık Mah. 3. O.S.B. İhsandede Cad. 20. Sk. No: 35 Selçuklu - KONYA
Tel: 0332 239 14 60 (Pbx) - Fax: 0332 239 14 66
info@safatarim.com - www.safatarim.com

