

CORVETTE®

Süspo Emülsiyon (SE)

Aktif Madde: 452,42 g/L (300 gae) 2,4 D EHE + 6,25g/L florasulam

Buğday, Arpa ve Mısırdaki Yabancı Ot Mücadelesinde
Sistemik ve Kontakt Etkili, Geniş Spektrumlu Herbisit

İLAÇ ÖZELLİKLERİ:

- Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
- İlaçlamadan 2 saat sonra yağın yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
- Toprakta bakiye bırakmaz.
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Sistemik ve kontakt etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir.
- Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etki yoktur.

KULLANMA ŞEKLİ:

CORVETTE, suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin tankına dökülür. Daha sonra aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

KULLANMA ZAMANI:

HUBUBAT (Buğday, Arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Donan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

MISIR: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

KALİBRASYON:

- Tavsiye edilen dozların 1 dekara (1000 m²) doğru miktarda ve homojen şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğü (debisi), memelerin altına konacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olduğu kontrol edilerek yapılır.
- İlaçlama aletinin tankı ilaçsız temiz suyla doldurulur. İlaçlama yapar gibi temiz suyun tamamı tüketilir. Islatılan alan ölçülür. Ölçülen alana göre bir tank dolusu suya gerekli miktar ilaç hesaplanır ve "Kullanma Şekli" paragrafında anlatıldığı gibi ilaçlama aletine katılır. Daha sonra aynı adımla veya vitesle yani aynı hızla ilaçlamaya geçilir. İlaçlama aletinin bir tank dolusunun yettiği alanın miktarının bilinmesi diğer uygulamalarda da faydalı olacaktır.

ALET TEMİZLİĞİ:

İlaçlamadan hemen sonra, ilaçlama aleti tamamen boşaltılır, aletin içi ve dışı tamamen yıkanır. Aletin tankının 1/10'u doldurulur ve ilaçlama borularının ve memelerinin temizlenmesi için alet çalıştırılır ve tamamen boşaltılır. İlaçlama aletinin tankı yarıya kadar su ile doldurulur, içine temizleyici bir preparat konarak tank su ile doldurulur. Alet karıştırıcısı ve püskürtme mekanizması çalıştırılır ve boruların ve memelerin temizlenmesi sağlanır. Aynı işlemler temiz suyla da yapılarak alet iyice durulanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Eagle Süper ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez. Sarban 4 E, Grand D ve Chlorpyrifos-methyl terkipli insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, fosfat ve potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu (ml/da)	Son ilaçlama ile hasat arası süre
BUĞDAY ARPA	Kandamlası (<i>Adonis aestivalis</i>) Sığır Dili (<i>Anchusa azurea</i>) Yatık Boya Kökü (<i>Asperuga procumbens</i>) Taşkesen Otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Sarı Ot (<i>Boreava orientalis</i>) Rum Yalancı Keteni (<i>Camelina rumelica</i>) Yabani Tere (<i>Cardaria draba</i>) Boynuz Otu (<i>Cerastium dicothomum</i>) Uzun Süpürge Otu (<i>Descurainia sophia</i>) Kıraç İtici (<i>Geranium stepporum</i>) Sarkık Meyveli Yavru Ağzı (<i>Hypocoum pendulum</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapsis arvensis</i>) Uzun Meyveli Bülbül Otu (<i>Sisymbrium altissimum</i>) Kaba Tüylü Fiğ (<i>Vicia narbonensis</i>) Adi Fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	50 ml	14 gün
BUĞDAY ARPA	Tarla Papatyası (<i>Anthemis fumarifolia</i>) Saka Dikeni (<i>Carduus pinocephalus</i>) Tarla Hazeranı (<i>Consolida regalis</i>) Boynuzlu Yoğurt Otu (<i>Galium tricornutum</i>) Çoban Deyneği (<i>Polygonum bellardii</i>) Tarla Dügün Çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Parmaklı Yavşan Otu (<i>Veronica triphyllos</i>)	60 ml	14 gün
BUĞDAY ARPA	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Kokarot (<i>Bifora radians</i>) Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Doğu Ballıbabası (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	70 ml	14 gün
MISIR*	İmam Pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Uzun Loğusa Otu (<i>Aristolochia clematidis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yatık Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Dil Kanatan (<i>Galium aparine</i>) Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Gece Sefası (<i>Ipomea stolonifera</i>) Adi Soda Otu (<i>Salsola kali</i>) Köpek Üzümlü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	70 ml	14 gün
MISIR*	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>) Tarla Sarması (<i>Convolvulus arvensis</i>)	80 ml	14 gün



Sarı Ot (*Boreava orientalis*)



Kokarot (*Bifora radians*)



Gökbaş (*Centaurea depressa*)



Kan Damlası (*Adonis aestivalis*)



Sığır Dili (*Anchusa azurea*)



Köygöçüren (*Cirsium arvense*)

(*) Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.