

TOP-CORP[®] SE

Fungisit (Mantar İlacı)

Suda Eriyebilen Sıvı Bakır

Aktif Madde Adı ve Miktarı:

Litrede 583 gram yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları
(51.4 g/L Metalik Bakıra eşdeğerdir)

**Daha Uzun Süreli Kontrol
Daha Az İlaçlama**




SAFA TARIM

ÖZELLİKLERİ:

TOP-COPP 5 E su ile çok kolay karışır ve terkinde yer alan yayıcı-yapıştırıcı sayesinde ihtiva ettiği bakırı yapraklara homojen olarak yayar ve ince bir bakır tabakası oluşturur. Bu nedenle daha uzun süre kontrol sağlayarak ilaçlama sayısı azalır. Yağmurla yıkanmaya çok dayanıklıdır. Ultraviyole ışınlarından etkilenmez, püskürtme aletlerini aşındırmaz, memeleri tıkamaz.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml/100 L. su	7 gün
	Ölü Kol (<i>Phomopsis viticola</i>) Yalnızca yaz ilaçlaması yapılır.	200 ml/100 L. su	7 gün
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 ml/da	7 gün
	Bakteriyel Benek Hastalığı (<i>Pseudomonas syringae</i>)	200 ml/da	7 gün
Zeytin	Halkalı Leke Hastalığı (<i>Spilocaea oleagina</i>)	350 ml/100 L. su	7 gün
Kayısı	Yaprak Delen (Çil hastalığı) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	500 ml/100 L. su (Dormant dönem) 250 ml/100 L. su (Normal dönem)	7 gün
Turuncgil	Kahverengi Leke Hastalığı (<i>Alternaria alternata f.sp.citri</i>)	300 ml/100 L. su	



Mildiyö (*Plasmopara viticola*)



Ölü Kol (*Phomopsis viticola*)



Erken Yaprak Yanıklığı (*Alternaria solani*)



Bakteriyel Benek Hastalığı (*Pseudomonas syringae*)



Halkalı Leke Hastalığı (*Spilocaea oleagina*)



Yaprak Delen (Çil hastalığı)
(*Wilsonomyces carpophylus*)



Kahverengi Leke Hastalığı
(*Alternaria alternata f.sp.citri*)

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlamaaletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeler takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.

UYGULAMA ZAMANI:

Bağda Mildiyö:

Sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. 2 haftalık aralarla 3-4 kez tekrarlanır.

Bağ'da Ölükol:

1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm boyda iken, 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm boyda iken, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Domateste Erken Yaprak Yanıklığı ve Bakteriyel Benek Hastalığı:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, gerekirse tekrarlanır.

Zeytinde Halkalı Leke hastalığı:

Marmara bölgesinde:

- ilaçlama: Tanelerin normal iriliğe eriştiği sonbaharda, meyveler yeşil dane döneminde iken. (Ekim)
- ilaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı ilkbahar döneminde. (Nisan)

Ege ve Akdeniz bölgesinde:

- ilaçlama: Ağaçların sürgün vermeden önceki durgun dönemi (Ege: Şubat-Mart, Akdeniz: Kasım-Aralık)
- ilaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı dönem (Nisan)

Kayısıda Yaprak Delen:

- ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem)
- ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem)
- ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası sıyrılırken (Normal dönem)

Turuncgilde Yaprak yanıklığı hastalığı:

İlkbahar sürgünlerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 10'ar gün ara ile tekrarlanır.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Top-Copp 5 E, Dodine terkipli ilaçlar hariç diğer birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılır. Şelatlı veya sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır.

Ruhsat Sahibi ve İmalatçı Firma : SAFA TARIM A.Ş.

Kayacak Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.