



Scan this QRcode

Menşei: HOLLANDA

Net Ağırlık/ Net Hacim:

EC FERTILIZER Bor (B) ve Molibden (Mo) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELİ KARIŞIM **FoliaStim B Mo Liquid**



UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen dozda FoliaStim B Mo Liquid ilave edilir. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve depo su ile tamamlanarak bitkilere pülverize edilir. Her türlü püskürtme aleti ile kullanılabilir. Hazırlanan karışım uzun zaman bekletilmeden kullanılmalıdır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(% w/w)

Suda çözünür, Bor (B)

2

Suda çözünür, Molibden (Mo)

0,4

UYARILAR:

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

ÇOCUKLARDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.

KORUYUCU ELDİVEN VE MASKE KULLANINIZ.

CİLT VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE BOL SU İLE YIKAYINIZ.

YİYECEK, İÇECEK VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

YÜTÜLMESİ HALİNDE DOKTORA BAŞVURUNUZ.

ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ VE GÜNEŞTEN KORUYUNUZ.

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ VE ASLA UYGUN DOZLARI AŞMAYINIZ.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orjinal ambalajında normal depolama şartlarında (kuru, rutubetsiz, güneş ışığı olmayan) (+ 5 / + 25 °C) de fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulmadan 2 yıl depolanabilir. Gıda, yiyeceklerden ve su kaynaklarından uzak tutunuz. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı, iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Karışılabilirlik Durumu:

Kullanmadan önce küçük bir karışım testi yapılmasını öneririz.

Taşıma Talimatı:

Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını, kıyafetlerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız.



İmal Tarihi :

Son Kull. Tarihi :

Şarj No :

Tavsiye Edildiği Bitkiler ve Kullanım Dozları

BİTKİLER	Yapraktan Uygulama	Kullanım Dozları
Meyve Ağaçları	1-3 uygulama: Tomurcuk, çiçek ve çiçek sonrası dönemde	100-200 ml/da (109-218 g/da)
Sebzeler	Çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyulan her zaman	200-250 ml/da (218-273 g/da)
Bağ, Zeytin, Narenciye, Fındık	1-3 uygulama: Tomurcuk oluşumundan itibaren	100-200 ml/da (109-218 g/da)
Tarla Bitkileri	1-3 uygulama: 6-8 yapraklı dönemden itibaren gelişim dönemi boyunca	200-400 ml/da (218-436 g/da)
Şeker Pancarı, Patates	1-3 uygulama: 6-8 yapraklı dönemden itibaren 10-14 gün aralıklarla	150-250 ml/da (164-273 g/da)
Ayçiçeği Kanola	1-3 uygulama: 6-8 yapraklı dönemden itibaren toprak açılmasına kadar 10-14 gün aralıklarla	200-400 ml/da (218-436 g/da)
Pamuk	Tarakanma başlangıcı öncesi	150-200 ml/da (164-218 g/da)
Çilek	Çiçeklenmeden hasat bitimine 2 hafta kalıncaya kadar 2 haftada bir	150-200 ml/da (164-218 g/da)

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Tavsiyeler genel olup yalnız rehber olarak alınmalıdır. Ürünün depolanması ve kullanılması firmaya kontrol edilemediğinden yanlış kullanımdan dolayı ortaya çıkacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Firma ürünün teslimi anında değişmeyen kalitesinden sorumludur.

Tescil No/Tarih :36325

Lisans no: 324

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

VAN İPEREN INTERNATIONAL B.V. HOLLANDA
Smidsweg 24 | 3273 LK Westmaas |
PK:1333 | 3260 Oud-Bellierland | Hollanda
Tel: +31 186 578 888
Fax: +31 186 573452



TESCİL SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

SAFA TARIM A.Ş.
BÜYÜKKAYACIK MAH 20 NOLU SOKAK
NO:31 42250 KONYA- TÜRKİYE
Tel: (0332) 239 14 60 pbx - Fax: (0332) 239 14 66



Menşei: HOLLANDA



V20.0625

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi paşinen kabul ederiz.

SAFA TARIM A.Ş.
Büyük Kayacak Mah. 20. Sok.
No: 31 Selçuklu / KONYA
Tel: 0332 239 14 60 736 007 6546

Şirket Vekili
Burak Kişin