

İmza Tarihi:

Son kullanma tarihi:

Şarj No:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR: Fare, Sıçan mücadelesi.

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fareler	Mesken veya mesken çevresinde, çocukların ve hedef dışı canlıların ulaşamayacağı yerlere ve yem istasyonu içinde	3-5 m aralıklarla 40 g	Ürünler tüketildikçe
Sıçanlar		5-10 m aralıklarla 80-100 g	

(Klasik biçimli bloklarda) Her bir Blok 20 gramdır.

(Badem biçimli bloklarda) Her bir Blok 5 gramdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Lancet Blok, kullanıma hazır bir fare ve sıçan zehiridir. Ürünün uygulama dozu mesken veya mesken çevresinde; yem istasyonları içerisinde fareler için 3-5 metre aralıklarla 40 g ve sıçanlar için 5-10 m aralıklarla 80-100 g'dır.

Lancet Blok, EL DEĞMEDEN yem istasyonu içerisine konur. (Farelerdeki gelişmiş koku yeteneği nedeniyle, çıplak el teması mücadelenin etkinliğini düşürür. Mutlaka eldiven kullanılmıdır.) Sonra, fare ve sıçanların en çok tespit edildiği ve kolayca ulaşabileceği, fare dışıklarının görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arklarına, tavan aralarına yerleştirilir.

Fare ve sıçanlar tüketikleri ürünle kanama sebebiyle ölürlür.

İstasyonlardaki yem haftada bir kontrol edilmeli, azalmış ise yenisi ile değiştirilmelidir.

Fare ve sıçan aktivitesi bitene kadar devam edilmelidir.

ÜRETİCİ FİRMA:

ACT

La Poste Française BP 258 AD 500 Andorra La Vella, ANDORRA PRINCEBİTİ

Ph. Mesken ve Sıçanlar İçin

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31, Selçuklu / KONYA 33090

Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66

<http://www.safatarim.com>

(Klasik biçimli blok ambalaj miktarları)

Paketlenen ürün miktarı: 100 g (5 x 20 g), 160 g (8 x 20 g), 200 g (10 x 20 g), 260 g (13 x 20 g), 500 g (25 x 20 g), 1 kg (50 x 20 g), 2 kg (100 x 20 g), 2,5 kg (125 x 20 g), 3 kg (150 x 20 g), 5 kg (250 x 20 g), 7,5 kg (375 x 20 g), 8 kg (400 x 20 g), 10 kg (500 x 20 g), 20 kg (1000 x 20 g), 25 kg (1250 x 20 g)

(Badem biçimli blok ambalaj miktarları)

Paketlenen ürün miktarı: 100 g (20 x 5 g), 150 g (30 x 5 g), 200 g (40 x 5 g), 250 g (50 x 5 g), 500 g (100 x 5 g), 1 kg (200 x 5 g), 2 kg (400 x 5 g), 2,5 kg (500 x 5 g), 3 kg (600 x 5 g), 5 kg (1000 x 5 g), 7,5 kg (1500 x 5 g), 8 kg (1600 x 5 g), 10 kg (2000 x 5 g), 20 kg (4000 x 5 g), 25 kg (5000 x 5 g)

(Bulk ithalatı ambalajı miktarı 10 kg'dır.)

Ambalaj açılmış ürünü 30 gün içerisinde kullanınız.

Ürün normal (25±2 °C) şartlar altında depolandığında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU:

UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve

PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

SAFA TARIM A.Ş.



LANCET BLOK

Formülasyon şekli:

Wax Blok

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (% a/a):

% 0.005 Difenacoum

3-[3-(1,1'-biphenyl)-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one;
CAS: 56073-07-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (% a/a):

% 0.001 Denatonium Benzoate

% 62,78 yem, %35 bağlayıcı madde, geri kalan koruyucu, renklendirici ve yenilebilir çözücü

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE

GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,

SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.



03 Aralık 2019

ÜRÜN TİPİ (14)

RODENTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. Üründeki pıhtılaşmayı baskılayan madde, nedeniyle zehirlenme belirtileri genellikle kanama ile ilgilidir. Bu belirtilerden bazıları, burun kanaması, tükürükte kan, idrarda kan, ciltte morartılar, dışkıda siyahılık veya kan, karn ve çevresinde ağrıdır.

Difenacoum Akut Oral LD₅₀(sıçan): 1.8 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri

Genel bilgi: Ürün içerisindeki aktif madde bir antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) maddedir. Antivitamin K antikoagülan etkisi bulunmaktadır ve bu etki zaman zaman devam edebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Ürünün etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

Solunam: Kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın.

Yutma: Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz teması: Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidotu vitamin K1'dir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Kullanmadan önce etiketi okuyun.

• HER TÜRLÜ TEMASTAN KAÇININ!

• Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde 25±2 °C'de muhafaza ediniz. Gübre, su, gıda ve yemlerden uzak tutunuz.

• Anılar için zehirli.

• Baklıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P260 Tozunu solumayın.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

İlave etiket bilgileri

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

İmal Tarihi: 04.10.2019

Son kullanma tarihi: 04.10.2019

Şarj No: 04.10.2019

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 04.10.2019

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR: Sıçan mücadelesi.

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	İstasyon içerisinde Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Sıçan	Mesken veya mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde dayanıklı istasyon içerisinde	60 g, 100 g, 140 g, 150 g, 160 g, 200 g, 240 g, 250 g, 260 g, 300 g	Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilmeli, aktivite devam ediyorsa uygulama tekrarlanmalı.

Her bir Blok 5-20 gramdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Lancet Blok, kullanıma hazır bir sıçan zehiridir. Mesken veya mesken çevresinde, taboda belirtildiği şekilde tek kullanımlık istasyonlar halinde kullanılır.
Lancet Blok, eldiven kullanılarak, sıçanların en çok tespit edildiği ve kolayca ulaşabilecek, sıçan dışkıların görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirilir.
Sıçanlar tüketikleri ürünle kanama sebebiyle ölürler. Sıçan aktivitesi bitene kadar uygulamaya devam edilmelidir.

ÜRETİCİ FIRMA:

ACT
La Poste Française BP 258 AD 500
Andorra La Vella,
ANDORRA PRENSLİĞİ

RUHSAT SAHİBİ ve DOLUM YERİ:

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31
Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60
Fax : (0332) 239 14 66
<http://www.safatarim.com>

Tek kullanımlık istasyon içine paketlenen ürün miktarı:

60 g, 100 g, 140 g, 150 g, 160 g, 200 g, 240 g, 250 g, 260 g, 300 g
(Bulk ithalatı ambalaj miktarı 10 kg'dır.)

Ambalaj açılmış ürünü 30 gün içerisinde kullanınız.

Ürün normal (25±2 °C) şartlar altında depolandığında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

SAFA TARIM A.Ş.



LANCET BLOK

Formülasyon şekli:

Wax Blok

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (% a/a):

% 0.005 Difenacoum
3-[3-(1,1-biphenyl)-4-yl]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one;
CAS: 56073-07-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (% a/a):

% 0.001 Denatonium Benzoate
% 62,78 yem, %35 bağlayıcı madde, geri kalan koruyucu, renklendirici ve yenilebilir çözücü

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE
GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ.
SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.



03 Aralık 2019

ÜRÜN TİPİ (14)
RODENTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belirtiler ortaya çıkması gecikebilir. Üründeki phtlaşmayı baskılayan madde nedeniyle zehirlenme belirtileri genellikle kanama ile ilgilidir. Bu belirtilerden bazıları, burun kanaması, tükürükte kan, idrarda kan, ciltte morartılar, dışkıda siyahılık veya kan, karn ve çevresinde ağrıdır.

Difenacoum Akut Oral LD₅₀(sıçan): 1.8 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Genel bilgi: Ürün içerisinde aktif madde bir antikoagülan (kanın phtlaşmasını önleyen) maddedir. Antivitamin K antikoagülan etkisi bulunmaktadır ve bu etki zaman zaman devam edebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Ürünün etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

Soluta: Kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın.

Yutma: Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Göz teması: Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Antidodu ve gerekli bilgiler
Antidodu vitamin K1'dir.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- HER TÜRLÜ TEMASTAN KAÇININ!
- Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde 25±2 °C'de muhafaza ediniz. Gübre, su, gıda ve yemlerden uzak tutunuz.
- Anılar için zehirlidir.
- Bağlıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
- H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmalıdır.
- P260 Tozunu solumayın.
- P280 Koruyucu eldiven kullanın.
- P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmalıdır.
- P260 Tozunu solumayın.
- P280 Koruyucu eldiven kullanın.
- P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

İmza Tarihi:

Son kullanma tarihi:

Şarj No:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR: Fare mücadelesi.

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	İstasyon içerisinde Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare	Mesken veya mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde dayanıklı istasyon içerisinde	40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g	Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilmeli, aktivite devam ediyorsa uygulama tekrarlanmalı.

Her bir Blok 5-20 gramdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Lancet Blok, kullanıma hazır bir fare zehiridir. Mesken veya mesken çevresinde, taboda belirtildiği şekilde tek kullanımlık istasyonlar halinde kullanılır.

Lancet Blok, eldiven kullanılarak, farelerin en çok tespit edildiği ve kolayca ulaşabileceği, fare dışklarının görüldüğü, kemirne izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arklarına, tavan aralarına yerleştirilir.

Fareler tüketikleri ürünle kanama sebebiyle ölürlür. Fare aktivitesi bitene kadar uygulamaya devam edilmelidir.

ÜRETİCİ FIRMA:

ACT

La Poste Française BP 258 AD 500

Andorra La Vella,

ANDORRA PRENSLIĞI

RUHSAT SAHİBİ ve DOLUM YERİ:

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31

Selçuklu / KONYA

Tel : (0332) 239 14 60

Fax : (0332) 239 14 66

<http://www.safatarim.com>

Tek kullanımlık istasyon içindeki ürün miktarı:

40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g

(Bulk ithalatı ambalaj miktarı 10 kg'dır.)

Ambalaj açılmış ürünü 30 gün içerisinde kullanınız.

Ürün normal (25±2 °C) şartlar altında depolandığında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU:

GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

SAFA TARIM A.Ş.



LANCET BLOK

Formülasyon şekli:

Wax Blok

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (% a/a):

% 0.005 Difenacoum

3-[3-(1,1-biphenyl)-4-yl]-1,2,3,4-tetrahydro-1-

naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one;

CAS: 56073-07-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (% a/a):

% 0.001 Denatonium Benzoate

% 62,78 yem, %35 bağlayıcı madde, geri kalan

koruyucu, renklendirici ve yenilebilir çözücü

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE

GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,

SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha

edilmelidir.



ÜRÜN TİPİ (14)

RODENTİSİT

ZEHRLENME BELİRTİLERİ:

Belirtiler ortaya çıkması gecikebilir. Üründeki pıhtılaşmayı baskılayan madde, nedeniye zehirlenme belirtileri genellikle kanama ile ilgilidir. Bu belirtilerden bazıları, burun kanaması, tükürükte kan, idrarda kan, ciltte morartılar, dışkıda siyahılık veya kan, karn ve çevresinde ağrıdır.

Difenacoum Akut Oral LD₅₀(sıçan): 1.8 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Genel bilgi: Ürün içerisinde aktif madde bir antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) maddedir. Antivitamin K antikoagülan etkisi bulunmaktadır ve bu etki zaman zaman devam edebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Ürünün etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

Soluta: Kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın.

Yutma: Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz teması: Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Antidodu ve gerekli bilgiler

Antidodu vitamin K1'dir.

ZEHRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Kullanmadan önce etiketi okuyun.

• HER TÜRLÜ TEMASTAN KAÇININ!

• Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde 25±2 °C'de muhafaza ediniz. Gübre, su, gıda ve yemlerden uzak tutunuz.

• Arılar için zehirlidir.

• Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P260 Tozunu solumayın.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.