



Daha iyi bir tarım için, ideal ortağınız.
Your ideal partner for better agriculture



FOLiD EC 880®





Emülsiyon Konsantre (EC)
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:
800 g/l prosulfocarb + 80 g/l metribuzin

Grubu	N8	C1:5	Herbisit(Yabancı Ot İlacı)
-------	----	------	----------------------------

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
PATATES	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	500 ml/da Çıkış öncesi
	Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)	
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	
	Büyük ısırganotu (<i>Urtica dioica</i>)	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	

ETKİ ŞEKLİ:

FOLİD EC 880, patates tarlalarındaki yabancı otlarla mücadelede çıkış öncesi (Pre-em) kullanılan 2 aktif maddeli seçici bir yabancı ot ilacıdır. Prosulfocarb, thiocarbamat grubu bir aktif olup Lipid metabolizmasını durdurur. Yaprak ve kökler tarafından alınarak meristematik dokuda gelişmeyi önleyerek etkili olur. Bitkilerde burulma görülür, kök ve sürgün gelişmesi durur. Koleoptillerden yaprak çıkışı olmaz. Metribuzin ise triazin grubu bir aktif olup fotosistem III de fotosentezi önler. Böylece **FOLİD EC 880**, her 2 aktif maddenin sinerjik etkisi sayesinde patatesteki mükemmel bir yabancı ot kontrolü sağlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama zamanı: Patates ekiminden sonra 1 hafta içinde, tarlaya sürgü çekiminden hemen sonra toprak henüz nemli iken, mümkünse akşam üzeri rüzgarsız bir havada ilaçlama yapılmalıdır.

Bitki tahammülü: tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur.



Sirken
(*Chenopodium album*)



Hakiki Papatya
(*Matricaria chamomilla*)



Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(*Amaranthus retroflexus*)



Semizotu
(*Portulaca oleracea*)



Şeytan Elması
(*Datura stramonium*)



Büyük ısırganotu
(*Urtica dioica*)



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)



Daha iyi bir tarım için, ideal ortağınız.
Your ideal partner for better agriculture

İMALATÇI FİRMA:
SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk.
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60 pbx
Fax : (0332) 239 14 66
Web : www.safatarim.com

YouTube /SAFATARIM

facebook /SAFA.TARIM.AS

@SAFA_TARIM