



Yüksek
Konsantrasyonlu
Bakır



Cupre[®] 700

BAKIRDA "SC FORMULASYONU" ile
HASTALIKLARLA ETKİLİ MÜCADELE



SAFA TARIM[®]

Cupre[®] 700

Süspansiyon Konsantre (SC)
FUNGİSİT (Mantar İlacı)
Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:
700 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakıroksiklorür
Etki Şekli: Kontak

Grubu

M1

Fungisit

ÖZELLİKLERİ:

Daha küçük partikül boyutu ile daha iyi kaplama sağlar. Yağmurdan etkilenmesi azdır. Suda üstün eriyebilme ve homojen dağılıma özelliği vardır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
*Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml/100 l su	14 gün
**Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 ml/100 l su	14 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	175 ml/100 l su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kaptan ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında karıştırıcı faal olmalıdır. Hazırlanmış ilaçlı mahlül fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Mildiyö: 1.ilaçlama sürgünler 25–30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Domateste Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır, 10-12 gün ara ile devam edilir.

Domateste Erken yaprak Yanıklığı: İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanır, iklim koşulları hastalık gelişimi için uygun devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile devam edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:


CUPRE 700 fungusit ve insektisitlerin büyük çoğunluğu ile karışabilir. Kalsiyum içeren ürünler, TMTD (Thiram) bazlı fungusitler ve DNOC içeren ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez. Organik fosforlarla ile karışımdan hemen sonra kullanılmalıdır.



Mildiyö
(*Plasmopara viticola*)



Mildiyö
(*Plasmopara viticola*)



Mildiyö
(*Phytophthora infestans*)



Erken Yaprak Yanıklığı
(*Alternaria solani*)



Ambalaj Şekli:
1 L * 20 adet



Daha iyi bir tarım için, ideal ortağınız.
Your ideal partner for better agriculture

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk.
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60 pbx
Fax : (0332) 239 14 66
Web: www.safatarim.com

YouTube /SAFATARIM

facebook /SAFA.TARIM.AS

@SAFA_TARIM