

İmal tarihi
Son Kull. Tarihi
Şarj No
Tescil No
Lisans No

:130

ÖZELLİKLERİ

RAMOZİN bitkilere azot fosfor ve aminoasit kaynağı olarak kullanılabilen organomineral gübredir.

Depolama Durumu: Normal Depolama Şartlarında (serin ve kuru) ve orijinal ambalajında muhafaza edilmek kaydı ile özelliklerini asgari 3 yıl korur.

Depolama Sıcaklığı: 0 ile 45 C derece olmalıdır.

Firma Beyanı: Ürünün kullanılması ve depolanması firmaca kontrol edilemediğinden hatalı kullanımdan ve depolamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı firmamız mesul tutulamaz. Firmamız ürünün teslimi anında değişmeyen kalitesinden sorumludur.

Piyasaya sunacağım etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak cezai işlemi aynen kabul ediyorum.

ORGANOMİNERAL GÜBRE

VİTAZİN

NP'li Sıvı Organomineral Gübre

Garanti Edilen İçerik	(%w/w)
Toplam Organik Madde:	%17
Toplam Azot	%3
Amonyum Azotu (N)	%2
Organik Azot	%1
Serbest Amino Asitler	%7
Toplam Fosforpentaoksit (P2O5)	%7,8
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5)	%7,8
PH	4-5

UYARILAR:

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
AĞIZ YOLUYLA VUCUDA ALMAYINIZ.
KULLANDIKTAN SONRA ELLERİNİZİ YIKAYINIZ.
ASLA UYGUN DOZLARI AŞMAYINIZ. SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Hacim :1 Lt.- 1,27 Kg



UYGULAMA ŞEKLİ:

Daima su ile karışım halinde uygulanmalıdır. Damlama sistemi, yağmurlama ve yaprakdan uygulanabilir.

Tavsiye edilen Bitkiler ve Kullanım Dozu

FİDELİK VE FİDANLIKLAR

Yeşil Aksam Uygulaması: Bitki gelişiminin 3. haftasından itibaren 50-100 ml/100 litre su dozunda kullanılır.

Topraktan Uygulama: 100 ml/da Dozunda haftada bir uygulanmalıdır.

SEBZELER MEYVELER VE SÜS BİTKİLERİ

Yeşil Aksam Uygulaması

200-300 ml / 100 L su ile her 15-20 günde bir uygulamaya yapılmalıdır.

Topraktan Uygulama

Birinci ayda 100 ml /da olmak üzere her hafta

2. aydan itibaren 200 ml /da 15 günde bir (ihtiyaç duyulduğunda)

MEYVE, BAĞ VE ODUNSU BİTKİLER

Yeşil Aksam Uygulaması: Tomurcuklanma öncesi ve sonrası 200 ml /da dozunda her 15 günde bir kullanılır.

Topraktan Uygulama: Tomurcuklanma öncesi ve sonrası olmak üzere 200-400 ml/da (ihtiyaç duyulduğunda)

Önemli Not: Burada verilen kullanım dozları üreticiyi yönlendirmek amacıyla tavsiye edilmiştir. Noksallığın derecesine göre bu dozlar artırılıp azaltılabilir. Yukarıda verilen dozlar mevcut deneme sonuçlarından elde edilmiştir.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU: Kükürt, bakır ve yağlar ile karışmaz. Diğer Tarım Kimyasalları ile geniş çaplı bir karışım yapmadan önce küçük çapta bir karışım denemesinin yapılmasını öneririz.

Kullanırken ve Depolarken Dikkat Edilecek Hususlar:

-Ambalajı ağzı kapalı olarak serin ve rutubetsiz yerlerde muhafaza ediniz.

-Günün sıcak saatlerinde uygulamaya yapmaktan kaçınınız.

Tescil Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık mah. 20 nolu sok No:31 Selçuklu/ Konya

Tel: 0332 139 14 60/Fax: 0332 139 14 66

Web: www.safatarim.com

İmalatçı Firma: PLYMAG / İSPANYA



Büyükkayacık Mahallesi: 20. Nolu Sokak No: 31
Tel : 0 332 239 14 60 - Fax: 239 14 66
Selçuklu V.D.: 7360076546 Selçuklu/KONYA