

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Tescil No / Tarih :
Lisans No : 324

ÖZELLİKLERİ

CAL BORON Liquid suda tamamen çözünür Saf ve yoğunluğu yüksek kalsiyum, azot ve bor yapraktan damlama sulama ile uygulanan bir gübredir.

Bor, kalsiyumun immobil element olduğu yani hareketsiz veya bitkinin bir yerinden diğerine yavaş hareket ettiği düşünüldüğünde, birbirlerini destekleyerek bitki tarafından absorbe edilip taşınmasını artırır.

Bitki hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde temel görev üstlenir. Bu özelliği ile bitkiyi tüm çevresel (kuraklık, yüksek ve düşük sıcaklık, tuz stres vb.) faktörlerden korur.

Ayrıca hücre bölünmesi, hücre gelişimindeki rolü ile kök büyümesi, bitki üst aksam büyüme ve gelişmesinde katkı sağlar. Kalsiyum eksikliğinde meyve, sebzelerde çürüme ve çatlama meydana gelir. Elmada acı benek, domates, biber ve patlıcanda çiçek burnu çürüklüğünü engeller.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Uygulama aletinin tankına bir miktar su konur, gereken miktarda CAL BORON Liquid devamlı karıştırılarak ilave edilir. Her türlü püskürtme aleti ile kullanılabilir. Hazırlanan karışım uzun zaman bekletilmeden kullanılmalıdır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal depolama şartlarında (kuru, rutubetsiz, güneş ışığı olmayan) ortamda + 5 °C / + 25 °C fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulmadan depolanabilir. Gıda, yiyeceklerden ve su kaynaklarından uzak tutunuz. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı, iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Karışılabilirlik Durumu:

Kullanmadan önce küçük bir karışım testi yapılmasını öneririz. Sülfat ve Fosfat içeren gübreler hariç diğer gübrelerle uyumludur. Bu nedenle ayrı bir gübre çözme tankı gereklidir veya gübreler farklı zamanlarda uygulanmalıdır.

Taşıma Talimatı:

Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını, kıyafetlerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız.

EC FERTİLİZER KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ (Damlama veya Yağmurlama Sulama Şeklinde Uygulama İçin)

CAL BORON Liquid

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N)	8,6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	8,6
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	17,4
Suda Çözünür Bor (B)	0,1

UYARILAR:

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
Cilt ve göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.
Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Yutulması halinde doktora başvurunuz.
Orijinal ambalajında saklayınız ve güneşten koruyunuz.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız ve asla uygun dozları aşmayınız.

Net Ağırlık:

Net Hacim:



Tavsiye Edildiği Bitkiler ve Kullanım Dozları

Bitkiler	Uygulama Zamanı	Damlama Sulama ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Sebzeler Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Fasulye	2-6 uygulama: Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	200-250 ml / 100 L Su (300-375 ml / 100 L Su)
Meyve Ağaçları	3-4 uygulama: Meyve tutumu, büyümesi ve hasada 2-4 haftaya kadar	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	200-300 ml / 100 L Su (300-450 ml / 100 L Su)
Bağ, Narenciye	3-4 uygulama: Meyve tutumu büyümesi ve hasat öncesine kadar	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	200-300 ml / 100 L Su (300-450 ml / 100 L Su)
Pamuk	2-3 uygulama: Taraklanma dönemi öncesi ve sonrası 15 gün ara ile	1-3 L / da (1,5-4,5 kg / da)	200-300 ml / da (300-450 ml / da)
Hububat Arpa, Buğday, Çeltik	2-3 uygulama: Kardeşlenme döneminden itibaren 15 gün ara ile	1-3 L / da (1,5-4,5 kg / da)	200-300 ml / da (300-450 ml / da)
Şekerpancarı, Havuç	2-3 uygulama: Çapadan sonra 15 gün ara ile	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	200-300 ml / da (300-450 ml / da)
Patates	Yumur oluşumundan itibaren yumru doldurması sonuna kadar	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	200-300 ml / 100 L Su (300-450 ml / 100 L Su)
Kavun, Karpuz	Kol ayırımından sonra 15 gün ara ile hasada kadar	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	200-300 ml / 100 L Su (300-450 ml / 100 L Su)
Ayçiçeği	1-2 Uygulama: Bitki boyu 25 cm boya erişince 15 gün ara ile	1-3 L / da (1,5-4,5 kg / da)	250-300 ml / da (375-450 ml / da)
Fındık	3 Uygulama: Çiçek öncesi meyve bağlama ve doldurma dönemi	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	250-300 ml / 100 L Su (375-450 ml / 100 L Su)
Çilek	Çiçek öncesinden gelişme dönemi boyunca	1-3 L / da (1,5-4,5 kg / da)	200-250 ml / 100 L Su (300-375 ml / 100 L Su)
Muz	Meyve oluşum öncesi ve sonrası	1-3 L / da (1,5-4,5 kg / da)	200-250 ml / 100 L Su (300-375 ml / 100 L Su)
Mısır	1-2 Uygulama: Bitki boyu 30-40 cm'den sonra	1-3 L / da (1,5-4,5 kg / da)	200-250 ml / da (300-375 ml / da)
Süs Bitkileri	2 Uygulama: Yapraklanma dönemi ve sonrası	1-3 L / da (1,5-4,5 kg / da)	200-250 ml / 100 L Su (300-375 ml / 100 L Su)
Soğan, Sarımsak	1 Uygulama: Dikimden 30 gün sonra	2-3 L / da (3-4,5 kg / da)	200-250 ml / da (300-375 ml / da)

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Tavsiyeler genel olup yalnız rehber olarak alınmalıdır. Ürünün depolanması ve kullanılması firmaca kontrol edilemediğinden yanlış kullanımdan dolayı ortaya çıkacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Firma ürünün teslimi anında değişmeyen kalitesinden sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

VAN İPEREN INTERNATIONAL B.V. HOLLANDA
Smidsweg 24 | 3273 LK Westmaas | PK:1333 | 3260 Oud-Belijerland | Hollanda
Tel: +31 186 578 888
Fax: +31 186 573452

TESCİL SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

SAFA TARIM A.Ş.
BÜYÜKKAYACIK MAH 20 NOLU SOKAK NO:31 42250 KONYA- TÜRKİYE
Tel: (0332) 239 14 60 pbx
Fax: (0332) 239 14 66

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20. Sok.
No: 31 Selçuklu / KONYA
Selçuk VD. 736 007 6546

**Şirket Vekili
Burak Kişin**

REV:01/02.02.2025