

SAFA TARIM®

Section®

WG

Kurşuni küf, Külleme ve Monilya mücadelesinde;
Koruyucu ve Önleyici Etki...



ÖZELLİKLERİ:

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, kontakt, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Boscalid ve Pyraclostrobin' in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkili madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera) Patlıcan (sera) Biber (sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150g/100 l su	3 gün
Domates (sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	60 g/100 l su	3 gün
Çilek	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g/100 l su	3 gün
Kayısı	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	100 g/100 l su	7 gün
Kiraz Şeftali	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	75 g/100 l su	7 gün

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Domates (sera), biber(sera), patlıcan(sera) Kurşuni Küf: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Domates(sera) Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Çilek Kurşuni Küf: 1.ilaçlama: İlk çiçeklerin % 10' u açınca, 2. ilaçlama: Çiçeklerin % 50'si açınca, 3.ilaçlama: ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Kayısı, kiraz ve şeftali Monilya: 1. İlaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Action Mz, Penthium DF, Alpac, Alecto WG gibi ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.



Kurşuni küf
(*Botrytis cinerea*)



Kurşuni küf
(*Botrytis cinerea*)



Külleme
(*Leveillula taurica*)



Monilya
(*Sclerotinia laxa*)



Ambalaj Şekli:
500 gr * 20 adet
1 Kg * 20 adet